



ROSA NOISETTIANA.<sup>(1)</sup>

*R. Germinibus ovatis pedunculisque villosulis; foliolis glabris simpliciter argute crenatis; petiolis glanduloso-subtomentosis, aculeatis; caule aculeis validis, subrectis; floribus paniculatis. (N.)*

LE ROSIER DE PHILIPPE NOISETTE.

DESCRIPTION.

Magnifique arbrisseau qui s'élève jusqu'à huit à dix pieds. Ses rameaux glabres sont armés d'aiguillons assez forts, un peu crochus, rougeâtres sur les branches florifères, et bruns sur les rameaux adultes. Les feuilles se composent de cinq à sept folioles ovales-pointues, rarement obtuses, glabres, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, simplement et finement crénelées: elles sont portées par des pétioles velus, munis de plusieurs petits aiguillons recourbés qui s'étendent, par-fois, jusque sur la nervure de la foliole impaire. A la base de ce pétiole sont deux stipules bifides, pointues au sommet, denticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, latérales et terminales,

(1) *Habitus.* Frutex magnitudine, circiter, 8—10 pedum. CAULES, robusti, aculeis sparsis armati. ACULEI validi, inaequales, subrecti. FOLIOLA, plerumque septenna, orbiculato-ovata, basi rotundata, apice partim acuta, partim obtusa, utrinque glabra. PETIOLI subpubescentes, aculeati. STIPULAE lanceolatae, acuminate, margine glandulosae. FLORES terminales, corymbosi; corymbus bracteis suffultus. PEDUNCULI raro simplices, saepius in pedicellos ternos divisi, bracteis ad basim cujusve ramificationis praediti. BRACTEAE angustae, mucronatae. CALICIS TUBUS (oblongo-oviformis), pedunculi et pedicelli omnino villosuli. LACINIAE CALYCINAE mucrone lineari terminatae, appendiculatae, intus albo-tomentosae, margine glandulis raris praeditae. COROLLA speciosa duplex, colore ex albo purpurascens, suavissime olens. PETALA obcordata. FRUCTUS ellipsoidicus. Maturum non vidi. Nomen ex D. Ph. NOISETTE, Horti-cult. in America Boreali. (N.)